



# COPPER 7.6% EDTA

## Chelate Solution

For the Correction of Copper Deficiencies in Crops and Ornamentals

### GUARANTEED ANALYSIS

Copper (Cu) (actual) (chelated) 7.6%

Ethylenediaminetetraacetic acid (minimum) (chelating agent) (EDTA) 35.0%

READ THE COMPLETE LABEL BEFORE USING

REGISTRATION NUMBER 2009035B FERTILIZERS ACT

Net Weight Per Litre: 1.25 Kg Do Not Store Below 0°C

NET VOLUME: 9.46 L

NET WEIGHT: 11.83 Kg

# CUIVRE 7,6 %

## Solution Chélatante d'EDTA

Pour la correction des carences en cuivre des cultures et des plantes ornementales

### GARANTIE D'ANALYSE

Cuivre (Cu) (réel) (chélaté) 7,6 %

Acide éthylène-diamino-tétra-acétique (minimum) (chélateur) (EDTA) 35,0 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT L'EMPLOI

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 2009035B LOI SUR LES ENGRAIS

Poids net par litre : 1,25 Kg Ne pas entreposer à moins de 0°C

VOLUME NET : 9,46 L

POIDS NET : 11,83 Kg

PPJOB#

12/08

Manufactured for/ Fabriqué pour:

United Agri Products Canada Inc.

789 Donnybrook Drive

Dorchester, Ontario N0L 1G5

Product inquiries / Renseignements sur les produits : 1-800-265-4624

24hr emergency contact / Contact en cas d'urgence, 24 heures sure 24 : 1-800-561-8273

Lot Number/Numéro de lot: \_\_\_\_\_



(01) 0 06 23111 00226 0

## GENERAL INFORMATION

COPPER 7.6% EDTA is a Fully-Chelated Micronutrient recommended especially for:

- (1) Mixing with liquid fertilizers for pre-emergent application.
- (2) Application in irrigation water, either alone or in combination with fertilizers and/or pesticides.
- (3) Mixing with water spray solutions for soil application.
- (4) Application either alone or as a component in other liquid mixtures where soil application is otherwise impractical.
- (5) Application as impregnated with dry fertilizer.

The prevention of micronutrient deficiencies in crop is preferable to correcting them after symptoms appear, although this can often be done by prompt soil application.

It is recommended that soil and/or plant tissue samples be analyzed to determine nutrient levels prior to using this product. This product is to be used where deficiencies, based on soil/tissue analysis, have been identified.

**CAUTION:** This fertilizer contains copper and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused

**TANK MIXES:** Do not mix with pesticides or other fertilizers without compatibility test. An adequate test for physical compatibility involves mixing in a small container the proper proportions of product with water and the other ingredients. Agitate and let stand for one hour. If a precipitate forms, apply the products separately. Do not reuse container.

**LIQUID FERTILIZER TANK MIXES:** Mix the product with liquid fertilizer, agitating to thoroughly disperse the elements. This can be achieved by adding the product to the mixing batch tank or inducting through a pump. When mixing in batch tank, add product to water or nitrogen solution before adding phosphate material

COPPER 7.6% EDTA should be well mixed with water or water/fertilizer solutions before application. For foliar application, use a dilution factor of 1 L COPPER 7.6% EDTA in at least 14L of water, water fertilizer or pesticide solution.

For additional information on rates, timing of application, and hybrids or crops susceptible to phytotoxicity, on the need to apply this product consult your local Extension Advisor.

May be stored for short periods (up to 3 months) in mild steel. For longer storage, use stainless steel, fibreglass, polyethylene, or certain other plastic materials. Copper or any of its alloys (brass or bronze) should never be used in any chelate handling system. Aluminum tanks are not recommended for storage of this product.

**CAUTION: Do not mix or contaminate any EDTA type chelates with strongly acid materials.**

## PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Work in well ventilated area. Wear a NIOSH approved respirator for mists and vapours. Wear chemical impervious gloves, footwear, coveralls or impervious apron. Protect eyes with goggles or a face shield.

### FIRST AID

If on skin: Remove all contaminated clothing. Wash skin and hair thoroughly with soap and water. Wash clothing before reuse. If irritation persists, get medical attention.

If in eyes: Flush with running water for at least 15 minutes while holding eyelids open to help flush out material. Get medical attention.

Ingestion: Drink 1-2 glasses of water and induce vomiting. Never induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. Keep head lower than chest to avoid aspiration into lungs. Call physician immediately or contact poison control centre.

Inhalation: Remove to fresh air. If breathing is difficult, administer oxygen; if breathing stops, administer artificial respiration. Get medical attention immediately.

## APPLICATION RECOMMENDATIONS

### FRUIT AND AND NUT CROPS

**APPLES AND PEARS: Soil:** In early spring apply 300 - 475 mL per tree. Application of this product combination with Zinc EDTA is recommended.

**APRICOTS, PEACHES, PLUMS, AND PRUNES: Soil:** In early spring apply 300 - 475 mL per tree.

**CHERRIES: Soil:** In spring apply 300 mL per tree.

**GRAPES: Soil:** Apply 0.5 to 2.4 L per ha in early spring.

**WALNUTS: Soil:** In early spring, apply 300 - 475 mL per tree. For severe deficiencies a second application may be required.

**OTHER FRUIT AND NUT CROPS: Soil:** In early spring apply 300 - 475 mL per tree.

### VEGETABLE CROPS

**TOMATOES: Soil:** Band or sidedress 1 - 5 L/ha at planting or within a few weeks after planting.

**COLE CROPS AND OTHERS, including Blackeyed Peas, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Cucumbers, Eggplants, Melons, Mustard, Onions, Parsnips, Peas, Peppers, Radishes, Spinach, Squash and others. Soil:** Band or sidedress 1 - 5 L/ha at planting or within a few weeks of planting.

### FIELD CROPS

**BEANS, including Soybeans & Dry Edible Beans: Soil:** Apply 1 - 5 L/ha with irrigation water, pesticides or fertilizer preplant or before the 4th trifoliate.

**CORN: Soil:** Band, sidedress or broadcast 1 - 5 L/ha preplant, at planting or within 2 weeks after emergence, or when deficiency symptoms first appear.

**POTATOES: Soil:** Band, sidedress, or broadcast 1 - 5 L/ha at planting or within 2 weeks after emergence. or when deficiency symptoms first appear.

**SORGHUM: Soil:** Band, sidedress, or broadcast 1 - 5 L/ha at planting or within 2 weeks after emergence, or when deficiency symptoms first appear.

**SUGAR BEETS: Soil:** Band, sidedress, or broadcast 1 - 5 L/ha at planting or within 3 weeks after planting. **OTHER FIELD CROPS, including Barley, Field Peas, Hops, Small Grains, Peanuts, Alfalfa, Mint and most other Field Crops: Soil:** Band, sidedress, or broadcast 1 - 5 L/ha at planting or within 2 weeks after emergence or when deficiency symptoms first appear.

### OTHER CROPS AND USES

**ORNAMENTALS, CONTAINER GROWN TREES AND SHRUBS, AND FIELD GROWN NURSERY STOCK. Soil:** Apply 5 - 10 mL/10 m<sup>2</sup>. Repeat applications if symptoms persist.

**GREENHOUSE GROWN CHRYSANTHEMUMS, ROSES, CARNATIONS, AND POTTED FLORAL PLANTS: Soil** only Apply 5 - 8 mL/10 m<sup>2</sup> at regular intervals with fertilizer or drip irrigation.

**TURF GRASSES:** Apply 1 L in a minimum of 200 L of water/ha or 10 - 16 mL in 2 L of water/ 100 m<sup>2</sup>. Mix with water, liquid fertilizer solution or pesticide solution and apply in early spring. Repeat as needed.

### APPLICATION WITH IRRIGATION WATER

**PIVOT, SPRINKLER, OVERHEAD AND SOLID SET IRRIGATION:** Apply 1 - 5 L of COPPER 7.6% EDTA/ha with irrigation water. For best results apply within 2 weeks of planting. The chelate may be mixed with fertilizer and/or pesticides before injection. Use back flow check valve to prevent material from running back into water system.

---

### **IMPREGNATION WITH DRY FERTILIZER**

This product may be impregnated or dry fertilizer for pre-emergent soil application. Impregnate immediately before or at planting.

Do not apply fertilizer combinations containing ammonium, potassium or sodium nitrate.

### **WARRANTY DISCLAIMER AND NOTICE**

THE DIRECTIONS FOR USE OF THIS PRODUCT ARE BELIEVED TO BE ADEQUATE AND SHOULD BE FOLLOWED CAREFULLY. IT IS IMPOSSIBLE TO ELIMINATE ALL RISKS INHERENTLY ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. CROP INJURY, INEFFECTIVENESS, OR OTHER UNINTENDED CONSEQUENCES MAY RESULT DUE TO SUCH FACTORS AS WEATHER CONDITIONS, PRESENCE OR ABSENCE OF OTHER MATERIALS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION, ALL OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER.

THE PRODUCTS SOLD TO YOU ARE FURNISHED "AS IS" BY UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER, AND ARE SUBJECT ONLY TO THE MANUFACTURER'S WARRANTIES, IF ANY, WHICH APPEAR ON THE LABELS TO THE PRODUCTS SOLD TO YOU. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTIES, GUARANTEES, OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THE PRODUCT SOLD OR USE OF THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, USE OR ELIGIBILITY OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR TRADE USAGE. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTY OF RESULTS TO BE OBTAINED BY USE OF THE PRODUCT. BUYER'S OR USER'S EXCLUSIVE REMEDY, AND UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC.'S, THE MANUFACTURER'S OR SELLER'S TOTAL LIABILITY, SHALL BE LIMITED TO DAMAGES NOT EXCEEDING THE COST OF THE PRODUCT. NO AGENT OR EMPLOYEE OF UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC. OR SELLER IS AUTHORIZED TO AMEND THE TERMS OF THIS WARRANTY DISCLAIMER OR THE PRODUCT'S LABEL OR TO MAKE A REPRESENTATION OR RECOMMENDATION DIFFERENT FROM OR INCONSISTENT WITH THE LABEL OF THIS PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE, HANDLING, APPLICATION, STORAGE OR DISPOSAL OF THIS PRODUCT OR FOR DAMAGES IN THE NATURE OF PENALTIES AND THE BUYER AND USER WAIVE ANY RIGHT THEY MAY HAVE TO SUCH DAMAGES.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le chélate de CUIVRE à 7,6 % et d'EDTA est un oligo-élément qu'on conseille d'employer surtout:

- (1) En mélange avec des engrais liquides, lors des applications en pré-lévée.
- (2) Dans l'eau d'irrigation, seul ou en association avec des engrais et/ou des pesticides.
- (3) En mélange avec des bouillies aqueuses, en pulvérisation sur le sol.
- (4) En application seul ou en mélange avec d'autres liquides là où l'incorporation au sol est impraticable.
- (5) En application par imprégnation d'engrais secs.

Dans les cultures, il vaut mieux prévenir les carences en oligo-éléments que les corriger après l'apparition des symptômes, mais, bien souvent, il est possible de les corriger en faisant sans tarder une application sur le sol.

Avant d'employer ce produit, il est conseillé de faire analyser le sol et/ou les tissus végétaux pour en déterminer la teneur en éléments nutritifs. Ce produit est destiné à être utilisé lorsque l'analyse du sol et/ou des tissus végétaux révèle une carence.

**ATTENTION:** Cet engrais contient du cuivre. Il faut en suivre le mode d'emploi, sinon il peut s'avérer nocif.

**MÉLANGE EN CUVE:** Avant de mélanger ce produit avec des pesticides ou d'autres engrais, vérifier la compatibilité des ingrédients. Pour ce faire, mélanger proportionnellement le produit, l'eau et les autres ingrédients dans un petit récipient. Agiter et laisser reposer pendant une heure. En cas de précipitation, appliquer séparément les produits. Ne pas réutiliser le récipient.

**MÉLANGE EN CUVE AVEC DES ENGRAIS LIQUIDES:** Mélanger le produit avec l'engrais liquide, et agiter pour bien disperser les éléments. Pour ce faire, on peut verser le produit dans une cuve de mélange en discontinu ou le faire passer dans une pompe. Dans ce dernier cas, ajouter le produit à l'eau ou à la solution azotée avant d'ajouter l'engrais phosphaté. Pour une application foliaire, utiliser un facteur de dilution de 1 litre de le chélate de CUIVRE à 7,6 % et d'EDTA dans au moins 14 litres d'eau, d'engrais liquide ou de solution antiparasitaire.

Avant d'appliquer le chélate de CUIVRE à 7,6 % et d'EDTA, on doit bien le mélanger avec l'eau ou la solution d'eau et d'engrais. Pour plus de renseignements sur les doses, le calendrier des traitements, les plantes, hybrides ou non, pouvant subir des effets phytotoxiques et le besoin d'appliquer ce produit, consulter le vulgarisateur agricole local.

On peut conserver ce produit dans un récipient en acier doux pendant une période allant jusqu'à 3 mois. Si la période d'entreposage est plus longue, employer un récipient en acier inoxydable, en fibres de verre, en polyéthylène ou en d'autres matières plastiques. Ne jamais conserver un chélate dans un récipient en cuivre (laiton et bronze y compris). Il est déconseillé de conserver ce produit dans une cuve en aluminium.

**ATTENTION:** Ne pas mélanger ni souiller les métaux chélatés à l'EDTA avec des substances très acides.

### MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Travailler dans un endroit bien ventilé. Porter un respirateur approuvé par NIOSH pour les brouillards et les vapeurs. Porter des gants de protection contre les produits chimiques, des chaussures ainsi qu'une combinaison ou un tablier imperméable. Se protéger les yeux avec des lunettes à coques ou un écran facial.

### PREMIER SOINS

Contact avec la peau: Enlever immédiatement les vêtements souillés. Bien laver la peau et les cheveux au savon et à l'eau. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser. Encas d'irritation persistante, obtenir des soins médicaux.

Contact avec les yeux: Rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en tenant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Faire vomir la personne immédiatement en lui faisant boire 1 à 2 verres d'eau. Ne jamais faire vomir ou administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Garder la tête plus basse que la poitrine pour éviter l'aspiration dans les poumons. Appeler un médecin immédiatement ou appeler un centre antipoison.

Inhalation: Transporter la personne à l'air frais. Si elle a des difficultés respiratoires, lui administrer de l'oxygène. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un médecin immédiatement.

## CONSEILS SUR L'APPLICATION CULTURES FRUITIÈRES

**POMMIER ET POIRIER: Sur le sol:** Appliquer 300 à 475 mL par arbre au début du printemps. Il est conseillé d'appliquer ce produit en association avec le chélate de zinc et d'EDTA.

**ABRICOTIER, PÊCHER, PRUNIER ET PRUNEAUTIER: Sur le sol:** Appliquer 300 à 475 mL par arbre au début du printemps.

**CERISIER: Sur le sol:** Appliquer 300 mL par arbre au printemps.

**VIGNE: Sur le sol:** Appliquer 0,5 à 2,4 L/ha au début du printemps.

**NOYER: Sur le sol:** Appliquer 300 à 475 mL par arbre au début du printemps. En cas de carence grave, il faudra peut-être faire une seconde application.

**AUTRES CULTURES FRUITIÈRES: Sur le sol:** Appliquer 300 à 475 mL par arbre au début du printemps.

## CULTURES LÉGUMIÈRES

**TOMATE: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne ou dans l'interligne lors de la plantation ou quelques semaines plus tard.

**CHOUX ET AUTRES LÉGUMES (dolique, chou, carotte, chou-fleur, céleri, concombre, aubergine, melons, moutarde, oignon, panais, pois, piment, radis, épinard et potiron, entre autres) Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne ou dans l'interligne lors de la plantation ou quelques semaines plus tard.

## CULTURES DE GRANDE PRODUCTION

**HARICOT, y compris le soja et le haricot sec comestible: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha avec l'eau d'irrigation, des pesticides ou d'autres engrais avant la plantation ou avant le 4<sup>e</sup> trifolié.

**MAÏS: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne, dans l'interligne ou à la volée soit avant la plantation, soit lors de la plantation, soit 2 semaines après la levée, soit dès l'apparition des symptômes de carence.

**POMME DE TERRE: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne, dans l'interligne ou à la volée soit lors de la plantation, soit 2 semaines après la levée, soit dès l'apparition des symptômes de carence.

**SORGHO: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne, dans l'interligne ou à la volée soit lors de la plantation, soit 2 semaines après la levée, soit dès l'apparition des symptômes de carence.

**BETTERAVE À SUCRE: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne, dans l'interligne ou à la volée soit lors de la plantation, soit moins de 3 semaines après la plantation.

**AUTRES CULTURES DE GRANDE PRODUCTION, y compris l'orge, le pois sec, le houblon, les petites céréales, l'arachide, la luzerne, la menthe et la plupart des autres cultures de grande production: Sur le sol:** Appliquer 1 à 5 L/ha sur la ligne, dans l'interligne ou à la volée soit lors de la plantation, soit 2 semaines après la levée, soit dès l'apparition des symptômes de carence.

## AUTRES CULTURES ET USAGES

**PLANTES ORNAMENTALES, ARBRES ET ARBUSTES EN CONTENEURS ET MATÉRIEL DE PÉPINIÈRE DE PLEIN CHAMP: Sur le sol:** Appliquer 5 à 10 mL pour 10 m<sup>2</sup>. Réappliquer si les symptômes persistent.

**CHRYSANTHÈME, ROSIER ET ILLET EN SERRE ET PLANTES À FLEURS EN POTS: Seulement sur le sol:** Appliquer régulièrement 5 à 8 mL pour 10 m<sup>2</sup> avec d'autres engrais ou lors de l'irrigation goutte à goutte.

**GAZON:** Appliquer 1 L pour au moins 200 L d'eau par hectare ou 10 à 16 mL pour au moins 2 L d'eau pour 100 m<sup>2</sup>. Bien mélanger avec l'eau, la solution d'engrais liquide ou la bouillie antiparasitaire, et appliquer au début du printemps. Répéter au besoin.

## APPLICATION AVEC L'EAU D'IRRIGATION

**IRRIGATION PAR PIVOT CENTRAL, PAR ASPERSION, SUR FRONDAISON OU FIXE EN COUVERTURE INTÉGRALE:** Appliquer 1 à 5 L de chélate de CUIVRE à 7,6 % et d'EDTA par hectare avec l'eau d'irrigation. Pour de meilleurs résultats, appliquer moins de 2 semaines après la plantation. On peut mélanger ce produit avec d'autres engrais et/ou des pesticides avant l'injection. Pour l'empêcher de retourner dans le système d'alimentation en eau, se servir d'un clapet antirefouleur.

## **IMPRÉGNATION D'ENGRAIS SECS**

On peut imprégner de ce produit des engrais secs destinés être appliqués sur le sol avant la levée. Imprégner juste avant la plantation ou lors de celle-ci.

Ne pas associer à des engrais mixtes contenant du nitrate d'ammonium, de potassium ou de sodium.

## **EXONÉRATION DE GARANTIE ET AVIS**

LE MODE D'EMPLOI POUR CE PRODUIT EST CONSIDÉRÉ COMME APPROPRIÉ ET IL FAUT S'Y CONFORMER ATTENTIVEMENT. IL EST IMPOSSIBLE D'ÉLIMINER TOUS LES RISQUES INHÉRENTS ASSOCIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. L'ENDOMMAGEMENT DE CULTURES, L'INEFFICACITÉ DU TRAITEMENT OU D'AUTRES CONSÉQUENCES NON INTENTIONNELLES PEUVENT EN RÉSULTER À CAUSE DE FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, LA PRÉSENCE OU L'ABSENCE D'AUTRES MATIÈRES OU BIEN LA MÉTHODE D'UTILISATION OU D'APPLICATION, QUI SONT TOUS INDÉPENDANTS DE LA VOLONTÉ DE UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., DU FABRICANT ET DU VENDEUR.

LES PRODUITS QUI VOUS SONT VENDUS SONT FOURNIS "TELS QUELS" PAR UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, ET ILS NE SONT COUVERTS QUE PAR LES GARANTIES DU FABRICANT QUI, LE CAS ÉCHÉANT, APPARAISSENT SUR LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS QUI VOUS ONT ÉTÉ VENDUS. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES, UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., LE FABRICANT ET LE VENDEUR N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À L'ACHETEUR OU À L'UTILISATEUR, DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE, OU PAR USAGE DU COMMERCE, STATUTAIRE OU AUTREMENT, CONCERNANT LE PRODUIT VENDU OU SON UTILISATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, SA QUALITÉ MARCHANDE, SON ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET SON ACCEPTABILITÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL PARTICULIER. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., LE FABRICANT ET LE VENDEUR N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS QU'ON POURRAIT OBTENIR EN SE SERVANT DU PRODUIT. LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'UTILISATEUR, AINSI QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ POSSIBLE DE UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., DU FABRICANT ET DU VENDEUR, SE LIMITERA À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS NE DÉPASSANT PAS LE COÛT DU PRODUIT. AUCUN AGENT DE UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC. OU DU VENDEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LES MODALITÉS DE CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE OU LE TEXTE DE L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT, NI À FAIRE UNE REPRÉSENTATION OU UNE RECOMMANDATION QUI DIFFÈRE DE L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT OU QUI N'EST PAS CONFORME À CETTE ÉTIQUETTE.

UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC., LE FABRICANT ET LE VENDEUR NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX RÉSULTANT DE L'EMPLOI, DE LA MANUTENTION, DE L'APPLICATION, DE L'ENTREPOSAGE OU DE L'ÉLIMINATION DE CE PRODUIT, NI DE DOMMAGES SE TRADUISANT PAR DES PÉNALITÉS, ET L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DU PRODUIT RENONCENT À TOUS LES DROITS QU'ILS POURRAIENT AVOIR À CET ÉGARD.

**COPPER 7.6% EDTA**

Respiratory problems could be aggravated by inhalation.

Contact with eyes, and/or skin may cause irritation.

MSDS is AVAILABLE.

- In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
- Wear suitable gloves.
- Wear suitable protective clothing.
- Wear eye/face protection.
- Do not breathe dust.
- Avoid contact with eyes.
- Avoid prolonged and repeated contact with skin.

**FIRST AID MEASURES:** Immediately flush skin or eyes with running water for at least 15 minutes, in case of contact with material.

Remove contaminated clothing and shoes.

In case of accident or if you feel ill, seek medical advice immediately.

**CUIVRE à 7,6 % et d'EDTA**

L'inhalation peut aggraver les problèmes respiratoires.  
Le contact avec les yeux et/ou la peau peut causer une irritation.  
Une FS est DISPONIBLE.

- En cas de ventilation insuffisante, se protéger au moyen d'un appareil respiratoire approprié.
- Porter des gants appropriés.
- Porter un appareil de protection pour les yeux et le visage.
- Porter un vêtement de protection approprié.
- Éviter de respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Oter les vêtements et les souliers souillés.

En cas d'accident ou de sensation de malaise, consulter immédiatement un médecin.



# COPPER 7.6% EDTA

## Chelate Solution

For the Correction of Copper Deficiencies in Crops and Ornamentals

### GUARANTEED ANALYSIS

Copper (Cu) (actual) (chelated) 7.6%  
Ethylenediaminetetraacetic acid (minimum) (chelating agent) (EDTA) 35.0%

### READ THE COMPLETE LABEL BEFORE USING

Registration number 2009035B Fertilizers Act

Net Weight Per Litre: 1.25 Kg Do Not Store Below 0°C

**NET VOLUME: 9.46 L      NET WEIGHT: 11.83 Kg**

# CUIVRE 7,6 %

## Solution Chélatante d'EDTA

Pour la correction des carences en cuivre des cultures et des plantes ornementales

### GARANTIE D'ANALYSE

Cuivre (Cu) (réel) (chélaté) 7,6 %  
Acide éthylène-diamino-tétra-acétique (minimum) (chélateur) (EDTA) 35,0 %

### LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT L'EMPLOI

Numéro d'enregistrement 2009035B Loi sur les engrais

Poids net par litre : 1,25 Kg Ne pas entreposer à moins de 0 °C

**VOLUME NET : 9,46 L      POIDS NET : 11,83 Kg**

PPJOB#

12/08

Manufactured for/ Fabriqué pour:  
United Agri Products Canada Inc.  
789 Donnybrook Drive  
Dorchester, Ontario N0L 1G5

Product inquiries / Renseignements sur les produits : 1-800-265-4624  
24hr emergency contact / Contact en cas d'urgence, 24 heures sure 24 : 1-800-561-8273

Lot Number/Numéro de lot: \_\_\_\_\_

TO OPEN CUT HERE POUR OUVRIR, COUPER ICI

**NORTTRACE**<sup>®</sup>

**UAP**  
CANADA

# COPPER 7.6% EDTA

## Chelate Solution

For the Correction of Copper Deficiencies in Crops and Ornamentals

GUARANTEED ANALYSIS

Copper (Cu) (actual) (chelated) 7.6%

Ethylenediaminetetraacetic acid (minimum) (chelating agent) (EDTA) 35.0%

READ THE COMPLETE LABEL BEFORE USING

REGISTRATION NUMBER 2009035B FERTILIZERS ACT

Net Weight Per Litre: 1.25 Kg

Do Not Store Below 0°C

NET VOLUME: 2 x 9.46 L

NET WEIGHT: 23.65 Kg

# CUIVRE 7,6 %

## Solution Chélatante d'EDTA

Pour la correction des carences en cuivre des cultures et des  
plantes ornementales

GARANTIE D'ANALYSE

Cuivre (Cu) (réel) (chélaté) 7,6 %

Acide éthylène-diamino-tétra-acétique (minimum) (chélateur) (EDTA) 35,0 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT L'EMPLOI

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 2009035B LOI SUR LES ENGRAIS

Poids net par litre : 1,25 Kg Ne pas entreposer à moins de 0 °C

VOLUME NET : 2 x 9,46 L POIDS NET : 23,65 Kg

PPJOB#

12/08

Manufactured for:/ Fabriqué pour:

United Agri Products Canada Inc.

789 Donnybrook Drive

Dorchester, Ontario N0L 1G5

Product inquiries / Renseignements sur les produits : 1-800-265-4624

24hr emergency contact / Contact en cas d'urgence, 24 heures sure 24 : 1-800-561-8273

Lot Number/Numéro de lot: \_\_\_\_\_



(01) 5 06 23111 00226 5

### COPPER 7.6% EDTA

Respiratory problems could be aggravated by inhalation.

Contact with eyes, and/or skin may cause irritation.

MSDS is AVAILABLE.

- In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
- Wear suitable gloves.
- Wear suitable protective clothing.
- Wear eye/face protection.
- Do not breathe dust.
- Avoid contact with eyes.
- Avoid prolonged and repeated contact with skin.

**FIRST AID MEASURES:** Immediately flush skin or eyes with running water for at least 15 minutes, in case of contact with material.

Remove contaminated clothing and shoes.

In case of accident or if you feel ill, seek medical advice immediately.



### CUIVRE à 7,6 % et d'EDTA

L'inhalation peut aggraver les problèmes respiratoires.

Le contact avec les yeux et/ou la peau peut causer une irritation.

Une FS est DISPONIBLE.

- En cas de ventilation insuffisante, se protéger au moyen d'un appareil respiratoire approprié.
- Porter des gants appropriés.
- Porter un appareil de protection pour les yeux et le visage.
- Porter un vêtement de protection approprié.
- Éviter de respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Oter les vêtements et les souliers souillés.

En cas d'accident ou de sensation de malaise, consulter immédiatement un médecin.