

INSECTICIDE

Badge®

Badge est un herbicide à large spectre qui lutte contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans toutes les cultures de blé, dans le maïs, l'orge, l'avoine, le seigle d'automne, le lin, le millet, et dans les semis de graminées et les graminées déjà établies. Badge se mélange en réservoir avec la plupart des herbicides à graminées homologués pour le blé, l'orge et le lin. Grâce à Badge, les cultivateurs qui cherchent à régler leurs problèmes de mauvaises herbes tout en améliorant leur bénéfice net sont assurés d'un désherbage efficace et d'une bonne récolte. Badge permet de supprimer les parties aériennes de mauvaises herbes à feuilles larges vivaces tenaces, tout en assurant une repousse suffisante pour un traitement avant ou après la récolte.

INGRÉDIENTS ACTIFS : Bromoxynil (225 g/L), MCPA (225 g/L).

CULTURES PROTÉGÉES : Orge, millet, maïs, blé dur, seigle d'automne, lin, blé, blé d'hiver, semis de graminées et graminées déjà établies, zones non cultivées (ne pas contre-ensemencer aux légumineuses).

TAUX D'APPLICATION : Appliquer 1,24 L/ha ou 500 ml/acre (un bidon de 10 L permet de traiter 20 acres).

VOLUME : Utiliser de 5 à 20 gallons d'eau par acre, ou de 50 à 200 L/ha.

MAUVAISES HERBES SENSIBLES ET STADE JUSQU'OUÙ LE PRODUIT EST EFFICACE

Jusqu'au stade 4 feuilles

Abutilon ⁵	Neslie paniculée
Amarante à racine rouge ¹	Persicaire pâle
Bardanette épineuse	Renouée persicaire
Bourse-à-pasteur	Renouée scabre
Colza spontané (y compris canola)	Sagesse-des-chirurgiens
Kochia ²	Saponaire des vaches ⁴
Lampourde glouteron	Silène noctiflore
Matricaire inodore ³	Soude roulante ²
Morelle d'Amérique	Tournesol spontané

Jusqu'au stade 6 feuilles

Tomate sauvage

Jusqu'au stade 8 feuilles

Chénopode blanc	Sarrasin de Tartarie
Moutarde des champs	Séneçon vulgaire
Petite herbe à poux	Tabouret des champs
Renouée liseron	Vélar fausse giroflée
Sarrasin	

Suppression des parties aériennes

Chardon des champs	Laiteron des champs
--------------------	---------------------

- 1 Peut ne pas être efficace dans le lin.
- 2 Appliquer avant que les plants aient atteint 5 cm.
- 3 Ne convient qu'aux semis de printemps.
- 4 Dans des conditions normales, le produit agit sur la saponaire des vaches jusqu'au stade 4 feuilles. Les plants plus avancés ont peu de chance d'être traités avec succès.
- 5 Vaporiser avant que les plants atteignent 8 cm.

Badge lutte contre d'autres mauvaises herbes quand il est mélangé en réservoir.



EN BREF

TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

MÉLANGES EN RÉSERVOIR :

Blé : Achieve 80DG[®], Avenge[®], Horizon[®], Puma[®] Super, Everest[®], MCPA, Ally[®], Refine Extra[®], et la plupart des éléments nutritifs pour végétaux Nortrace.

Orge : Achieve 80DG, Avenge, MCPA, Ally[®], et la plupart des éléments nutritifs pour végétaux Nortrace.

Maïs : Atrazine[®].

Lin : Poast Ultra[®], Select[®], et la plupart des éléments nutritifs pour végétaux Nortrace.

Avoine : MCPA.

Il est recommandé d'effectuer un test de floculation avec Badge, l'autre élément du mélange et les éléments nutritifs pour végétaux Nortrace avant de mélanger.

PÉRIODE D'APPLICATION :

Blé, orge, avoines : entre le stade 2 feuilles et la feuille étendard.

Blé d'hiver, seigle d'automne : au stade 2 à 4 feuilles à l'automne, ou après le début de la croissance au printemps (jusqu'au stade de la feuille étendard).

Maïs : entre le stade 4 et 6 feuilles.

Millet : entre le stade 3 et 5 feuilles.

Lin : entre 5 et 10 cm.

PRÉCAUTIONS : Lire l'étiquette de Badge avant de l'appliquer par voie aérienne. Ne pas appliquer si la température est de plus de 27 °C, ou si la culture est soumise à un stress.

NOTE : Pour une lutte optimale, les mauvaises herbes doivent être traitées quand elles sont jeunes et en période de croissance active.

DÉLAI MINIMAL AVANT LA PLUIE : Une heure.

DÉLAI AVANT LA RÉCOLTE : De 30 à 60 jours; voir l'étiquette pour les détails.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT : La solution vaporisée doit avoir séché sur le dessus des plants.

FORMAT DE L'EMBALLAGE : 2 bidons de 10 L par caisse.

RÉMANENCE : Aucune.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : L'utilisation d'une buse à jet plat est recommandée. Le vaporisateur doit être propre avant l'utilisation. Utiliser un nettoyant à réservoir tel *All Clear*.

SURFACANT : Aucun surfactant n'est nécessaire, sauf si l'autre produit du mélange en réservoir en exige un. Suivre les indications sur l'étiquette de l'autre produit.

NOUVELLE CULTURE : Aucune restriction pour l'année qui suit l'application.

ENTREPOSAGE : Le produit supporte le gel; s'il a gelé, laisser le produit se réchauffer et bien l'agiter avant utilisation.

GROUPES D'HERBICIDES : Groupes 4 et 6.

NOTES



[®]Badge est une marque déposée des Produits Agri-Unis (UAP). Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs compagnies respectives.