



## TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

### MAUVAISES HERBES ET TAUX D'APPLICATION

**TRÈS SENSIBLES : Utiliser de 550 mL/ha (223 mL/acre)**

Moutarde des champs

**SENSIBLES : Utiliser 700 mL/ha (283 mL/acre)**

Chénopode blanc      Petite herbe à poux

Herbe puante      Sisymbre élevé

Neslie paniculée      Vélar fausse giroflée

**MODÉRÉMENT SENSIBLES :**

**Utiliser 975 L/ha (395 mL/acre)**

Ansérine de Russie      Radis sauvage

Bardane      Sarrasin

Bourse-à-pasteur      Tournesol

Plantain commun

**MODÉRÉMENT RÉSISTANTES :**

**Utiliser 1,5 L/ha (600 mL/acre)**

Amarante à racine rouge      Patience crépue

Chardon des champs      Pissenlit des champs

Laiteron potager      Prèle

Liseron      Renouée

Ortie royale

**RÉPRESSION DES VIVACES ET DES PARTIES AÉRIENNES SEULEMENT :**

**Utiliser 2,0 L/ha (de 810 mL/acre).**

Centaurée rampante      Soude roulante

Euphorbe éssule      Spargoute des champs

Laiteron des champs

Vérifier les taux d'utilisation avec les recommandations de la culture traitée pour respecter sa tolérance. Les taux recommandés devraient être augmentés de 1/3 dans des conditions de croissance défavorables ou si les mauvaises herbes sont développées.

**VOLUME :** Utiliser la quantité d'eau nécessaire pour une distribution du produit et une couverture des mauvaises herbes uniformes.

### MÉLANGES EN RÉSERVOIR :

Mélanges en réservoir homologués sur l'étiquette de MCPA Ester ou du produit avec lequel il peut être mélangé

#### Herbicides

Achieve® 80 DG/Liquid      Glyphosate

Achieve® Extra Gold      Harmony Total®

Ally®      Horizon®

Assert®      Lontrel®

Avenge      Poast Ultra®

Bromoxynil      Puma Super®

Champion® Extra      Refine Extra TNG®

Everest®      Select®

Fusion®      Sundance®

#### Insecticides

Decis®      Lorsban®

**PRÉCAUTIONS :** Éviter la dérive par vaporisation sur toute végétation sensible. Vaporiser dans des conditions qui minimisent la dérive. Une dose trop élevée de MCPA Amine peut inhiber la germination des graines et la croissance des plants de façon temporaire.

**DÉLAI MINIMAL AVANT LA PLUIE :** Une averse moins de 2 heures suivant l'application du produit diminue l'efficacité du désherbage.

**DÉLAI AVANT LA RÉCOLTE :** Ne pas laisser les animaux brouter pendant les sept jours suivant l'application du produit.

**DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT :** Une fois que le produit vaporisé est sec dans la zone traitée.

**FORMAT DE L'EMBALLAGE :** 2 bidons de 10 L.

**PERSISTANCE :** Aucune.

**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :** Vaporiser le produit par temps chaud quand les mauvaises herbes sont jeunes et en croissance active.

**SURFACTANT :** Non nécessaire.

**NOUVELLE CULTURE :** Aucune restriction l'année suivant le traitement.

**ENTREPOSAGE :** Le produit peut être congelé.

**GROUPE D'HERBICIDES :** Groupe 4.