

HERBICIDE

Sword®

Herbicide pour une lutte systémique contre plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges dans l'orge, les graines à canaris, l'avoine, les jachères, le blé, les semis de graminées et les graminées établies.

CULTURES PROTÉGÉES : Orge, graines à canaris, blé dur, avoine, jachères, blé, blé d'automne, semis de graminées et graminées établies (non contre-ensemencées de légumineuses).

TAUX D'APPLICATION : Appliquer de 1,0 à 1,5 L/ha (de 0,4 à 0,6 L/acre) (un contenant couvre de 25 à 16,7 acres).

VOLUME : Utiliser de 50 à 100 L/ha (de 5 à 20 gal./acre) pour emploi au sol et un minimum de 30L/ha (de 3 gal./acre) pour emploi par voie aérienne.

MÉLANGE EN RÉSERVOIR : Horizon®, Everest (blé seulement). Éléments nutritifs pour plantes Nortrace (faire un test de floculation avec Nortrace avant de faire un mélange en réservoir). Pour d'autres mélanges en réservoir, consulter l'étiquette du produit.

PÉRIODE D'APPLICATION :

Orge : Stade 2 à 4 feuilles.

Blé (de printemps, dur), avoine, graines à canaris : stade 2 à 5 feuilles.

Blé d'automne : appliquer au printemps avant que les plants n'atteignent plus de 30 cm (feuille de tête déployée).

MAUVAISES HERBES ANNUELLES HIVERNALES :

Devrait être vaporisé dès que les nouvelles pousses apparaissent.

MAUVAISES HERBES SENSIBLES

Amarante à racine rouge	Renouée (liseron, sarrasin de Tartarie et sarrasin de culture spontanée)
Bourse-à-pasteur	Renouée annuelle
Chénopode blanc	Renouée persicaire
Colza et canola spontanés	Renouée scabre
Gaillet gratteron ¹	Sagesse-des-chirurgiens
Kochia à balais	Saponaire des vaches
Laiteron potager	Silène noctiflore
Moutardes (moutarde des champs, neslie paniculée, sisymbre élevé, vélar fausse giroflée, moutarde des oiseaux)	Soude roulante ³
Ortie royale ²	Spargoute des champs
Petite herbe à poux	Tabouret des champs
	Tournesol spontané
	* Aussi stellaire moyenne, folle avoine et millet par mélange en réservoir

CONTRÔLE DES PARTIES AÉRIENNES SEULEMENT

Chardon des champs	Liseron des champs
Laiteron des champs	Liseron des haies

* Gaillet gratteron : vaporiser au stade verticille 1 ou 2.

**Ortie royale : vaporiser avant le stade 2 feuilles vraies.

*** Soude roulante : vaporiser quand les plans mesurent moins de 5 cm.



EN BREF

