

HERBICIDE

Topside®

Topside est un herbicide à large spectre qui lutte contre les mauvaises herbes à larges feuilles dans les semis de trèfle, les semis de graminées, les pois, le maïs et les pâturages. Il est efficace pour la lutte d'un bon nombre de mauvaises herbes vivaces et annuelles et est idéal pour le contrôle des mauvaises herbes dans les semis de fourrage.

GARANTIE : 375 g/L de MCPB (sous forme de sel de sodium), 25 g/L de MCPA (sous forme de sel de sodium).

TAUX D'APPLICATION : De 2,75 à 4,25 L/ha (de 1,11 à 1,72 L/acre), selon la culture et les mauvaises herbes visées.

VOLUME : Il est recommandé d'utiliser de 150 à 200 L/ha (de 13,3 à 17,8 50 à 200 gal./acre) d'eau vaporisée. Ne pas excéder 275 kPa de pression.

MÉLANGE EN RÉSERVOIR : Aucun.

PRÉCAUTIONS : Des dommages peuvent être causés aux semis de légumineuses destinés au le fourrage si le produit est vaporisé pendant une sécheresse ou quand la culture subit un stress. Éviter la dérive par vaporisation sur des végétaux et des cultures sensibles au produit.

DÉLAI MINIMAL AVANT LA PLUIE : Le produit est moins efficace s'il pleut dans les 2 heures suivant son application.

MAUVAISES HERBES SENSIBLES ANNUELLES

SENSIBLES : Utiliser 2,75L/ha

Chénopode blanc	Tabouret des champs
Moutarde des champs	Vélar fausse giroflée
Neslie paniculée	

MODÉRÉMENT SENSIBLES : Utiliser 4,25L/ha

Amarante à racine rouge	Ortie royale
Bourse-à-pasteur	Herbe à poux
Laiteron potager	Radis sauvage

MAUVAISES HERBES SENSIBLES VIVACES

MODÉRÉMENT SENSIBLES : Utiliser 4,25L/ha

Chardon vulgaire	Plantain
Patience crépue	

CONTRÔLE DES PARTIES AÉRIENNES : Utiliser 4,25L/ha

Chardon des champs	Prèle
Laiteron annuel	Renoncule âcre
Liseron des champs	Renoncule rampante

DÉLAI AVANT LA RÉCOLTE : Ne pas faire pâturer les animaux dans les cultures traitées, ni les utiliser pour le fourrage l'année de l'établissement de la culture.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT : La solution doit être bien sèche sur le dessus des plants.



EN BREF

TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

FORMAT DE L'EMBALLAGE : 2 bidons de 10 L par caisse.

SURFACTANT : Aucun.

PERSISTANCE : Aucune.

NOUVELLE CULTURE : Aucune restriction

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : Vaporiser le produit par vaporisation quand les cultures sont en bonne croissance et que les mauvaises herbes sont à un stade de croissance susceptible.

ENTREPOSAGE : Le produit ne doit pas geler.

GROUPE D'HERBICIDES : Groupe 4.

CULTURES HOMOLOGUÉES ET PÉRIODES D'APPLICATION

Culture			Période d'application
Agropyre à chaumes rudes	Agropyre pubescent	Fétuque élevée	Appliquer au stade 2 à 4 feuilles pour la lutte contre les mauvaises herbes à feuilles larges annuelles et vivaces.
Agropyre à crête	Alpiste roseau	Fétuque rouge traçante	
Agropyre allongé	Brome inerme	Fléole des prés	
Agropyre de l'Ouest	Brome des prés	Semis de graminées	
Agropyre des berges	Élyme de Russie	Stipe verte	
Agropyre du Nord	Élyme étroite		
Agropyre intermédiaire	Fétuque des prés		
Blé	Avoine	Orge	Stade deux feuilles ou tôt au stade de la feuille étendard.
Seigle			
Champs de maïs			Quand les plans mesurent de 30 à 60 cm (de 12 à 24 po.), mais avant la floraison mâle. Une buse à jet dirigée devrait être utilisée.
Pâturage (établi)			Appliquer le produit une fois que les animaux ont pâturé ou après la coupe quand les mauvaises herbes sont susceptibles de croître.
Pois			Quand les pois ont des trois à six feuilles étendues.
Semis de trèfle	Blanc sauvage	Blanc hollandais	Avec ou sans culture-abri, vaporiser le produit après le stade primaire ou stade d'apparition de la première feuille jusqu'au stade 4 vraies feuilles.
Ladino	Alsike	Rouge	

NOTES



®Topside est une marque déposée des Produits Agri-Unis (UAP). Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs compagnies respectives.

Ouest : 1-800-561-5444

Ontario : 1-800-265-4624

Québec et les Maritimes : 1-800-361-9369